

AMINO-S



GENERALIDADES

Amino - S® es una enmienda nitrogenada altamente asimilable (bioestimulante) con efecto de estimulante debido a su composición de aminoácidos libres, esta formulación permite la rápida absorción foliar y radicular, por consiguiente, ayuda al cultivo construir sus propias proteínas y tejidos de forma rápida y con ahorro de energía. La biotecnología de producción de Amino - S® nos asegura un producto libre de metales pesados.

Ingrediente Activo <i>Aminoácidos</i>	AMINOÁCIDOS
Modo de acción	Amino - S® enmienda nitrogenada altamente asimilable (bioestimulante) que ayuda a mitigar el estrés del cultivo, principalmente hídrico y solar, mediante el ahorro de energía y la síntesis de hormonas de crecimiento, y esto hará que el cultivo exprese una mayor calidad en todos sus tejidos (tallo, hojas, flores y frutos).
Concentración	Aminoácidos libres: 7.5% Nitrógeno total: 2.0% Materia orgánica: 15.0% Fosforo: 0.5% Potasio: 0.2% Calcio: 0.4%
Formulación	Líquida
Presentación	1L, 5L, 25L, 200L
Fabricación y Distribución	CitoAgro SAC

VENTAJAS

- No contamina ni deja residuos.
- Ayuda al antiestrés del cultivo
- Favorece el cuajado y crecimiento de los frutos
- Incrementa el desarrollo de tejidos.
- Aumenta la absorción de nutrientes.
- Actúan como nutrientes de la fauna microbiana, activando la vida en el suelo.

Condiciones para su uso #1

Aplicaciones vía sistema de riego

Cultivo	Dosis	Instrucciones de aplicación y manejo
Cebolla	2 Lt/Ha	Iniciar con aplicaciones de 2 L/ha desde el trasplante hasta la adaptación de la plántula a campo. Continuar las aplicaciones de 1 a 2 L/ha durante desarrollo del cultivo en periodos de 20 días hasta el desarrollo de frutos.
Tomate y Pimiento	2 Lt/Ha	Iniciar con aplicaciones de 1 L/ha desde el trasplante hasta la adaptación de la plántula a campo. Continuar las aplicaciones de 1 a 2 L/ha durante desarrollo del cultivo en periodos de 15 días hasta el desarrollo de frutos.
Alcachofa	3 Lt/Ha	Aplicar a los 10 días de cultivo y repetir aplicación cada 30 días.
Espárrago	3 Lt/Ha	Aplicación de 3 L/ha al emerger los turiones. Aplicación de 3 L/ha cada 15 días al inicio de la ramificación y durante el desarrollo de los nuevos brotes
Palto	5 Lt/Ha	Hacer aplicaciones en brotación, floración, cuaja y llenado de fruta.
Granado	5 Lt/Ha	Hacer 2 a 3 aplicaciones a intervalo quincenal durante desarrollo vegetativo y fructífero.
Uva	5 Lt/Ha	Hacer aplicaciones en brotación, floración, y llenado de fruta.
Arándano	5 Lt/Ha	Iniciar aplicaciones en brotación y seguir a los largo del estadio vegetativo con intervalos de 20 días.
Limón	5 Lt/Ha	Hacer 2 a 3 aplicaciones a intervalo quincenal durante desarrollo vegetativo y fructífero.

***Nota:** Todas las aplicaciones deben hacerse con el terreno húmedo o aplicarse junto con el riego habitual.

Condiciones para su uso #2

Aplicaciones foliares.

Cultivo	Dosis	Instrucciones de aplicación y manejo
Frutales	6 Lt/Ha	Iniciar con aplicaciones en brotación, floración, cuaja y llenado de fruta.
Hortalizas	4 Lt/Ha	Iniciar con aplicaciones durante el desarrollo vegetativo cada 20 días.

INSTRUCCIONES DE MANIPULACIÓN

- Conservar en un lugar fresco, seco, bajo sombra, protegido y solo destapar para usar.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Evitar el contacto con los ojos o la inhalación directa, se debe utilizar equipo de seguridad completo: guantes, máscara completa y equipo protector corporal.
- Agite el envase, desenrosque la tapa y mezcle.
- Se aplica por aspersión foliar, mezclado con agua para lograr una correcta cobertura del follaje.

COMPATIBILIDAD

- Amino - S[®] es compatible con la mayoría de los, fertilizantes foliares y bioestimulantes de uso agrícola. Evitar mezclas con productos muy ácidos y alcalinos.