


C-KOPER



GENERALIDADES

C-KOPER® es un fertilizante foliar a base de sulfato de cobre, formulado como una solución líquida de fácil aplicación mediante aspersión directa sobre el follaje de las plantas. Su formulación especializada ofrece un control de amplio espectro, actuando eficazmente contra una variedad de hongos patógenos que comúnmente afectan los cultivos, así como contra algunas bacterias perjudiciales. La aplicación preventiva crea una barrera protectora sobre la superficie de las hojas, lo que dificulta el establecimiento y la propagación de los patógenos. Es importante destacar que la biotecnología de vanguardia empleada en la producción de **C-KOPER®** garantiza un producto de alta calidad, pureza y libre de metales pesados.

Ingrediente Activo	
Sulfato de cobre pentahidratado	
Modo de acción	Sulfato de cobre pentahidratado
	C-KOPER® se centra en la generación de radicales libres, los cuales inducen estrés oxidativo en las células patógenas. Este proceso se ve complementado por la despolarización de la membrana celular, lo que altera la permeabilidad y el funcionamiento normal de la célula. Además, C-KOPER® presenta un modo de acción como protector de contacto, donde los iones de cobre presentes en su formulación pueden eliminar la célula de la espora al entrar en contacto directo con ella.
Concentración	Sulfato de cobre pentahidratado 27.5 g/L Aminoácidos libres 15%
Formulación	Líquida
Presentación	1L, 5L, 25L, 200L
Fabricación y Distribución	CITOAGRO SAC

VENTAJAS

- Eficaz frente al control de hongos.
- Eficaz frente al control de bacterias.
- No mancha ni deja residuos.
- Activa el sistema radicular debido a su formulación con estimulantes.
- No contamina debido a su alta solubilidad.

CONDICIONES PARA SU USO

PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES RADICULARES

Cultivo	Dosis	Instrucciones de Aplicación y Manejo
Suelos antes de sembrar	5 Lt/Ha	Antes de sembrar, desinfectar el suelo preparado con 6 Lt/Ha de C-KOPER
Cebolla	3 Lt/Ha	Aplicar 4 Lt/Ha a los 30 días de trasplante definitivo a campo.
Tomate y Pimiento	4 Lt/Ha	Aplicar 4 Lt/Ha a los 25 días de cultivo.
Alcachofa	4 Lt/Ha	Aplicar a los 35 días de cultivo y repetir aplicación a los 50 días
Espárrago	4 Lt/Ha	Aplicar en la segunda semana de cultivo y repetir aplicación en la cuarta semana.
Palto	3 Lt/Ha	Aplicar en brote, floración y cuajado.
Granado	4 Lt/Ha	Aplicar 1 Lt/ Ha en brotación, floración y llenado de fruta.
Uva	4 Lt/Ha	Aplicar 1 Lt/ Ha en brotación, floración y cuaja.
Arándano	4 Lt/Ha	Aplicar 1Lt/Ha en brotación, 2Lt/Ha en floración y 1Lt/Ha en llenado de fruta.
Pitahaya	4 Lt/Ha	Aplicar 1Lt/Ha en brotación, 2Lt/Ha en floración y 1Lt/Ha en llenado de fruta.
Cítricos	4 Lt/Ha	Aplicar 1Lt/Ha en brotación, 2Lt/Ha en floración y 1Lt/Ha en llenado de fruta.

***Nota:** Todas las aplicaciones deben hacerse con el terreno húmedo o aplicarse junto con el riego habitual.

CONDICIONES PARA SU USO

PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES FOLIARES

Cultivo	Dosis	Instrucciones de Aplicación y Manejo
Frutales	0.6/cilindro	Aplicar en brote, floración y cuaja.
Hortalizas	0.4/cilindro	Aplicar en brote, floración y cuaja.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Conservar en un lugar fresco, seco, bajo sombra, protegido y solo destapar para usar.

INSTRUCCIONES DE MANIPULACIÓN

- Evitar el contacto con los ojos o la inhalación directa, se debe utilizar equipo de seguridad completo: guantes, máscara completa y equipo protector corporal.
- En caso de contacto con piel u ojos puede causar enrojecimiento, irritación y dolor.
- En caso de contacto o ingestión, quitar las prendas contaminadas, lavar las partes afectadas y beber abundante agua y llevar a la persona a que respire abundante aire fresco.

COMPATIBILIDAD

- C-KOPER® es compatible con la mayoría de los pesticidas, fertilizantes foliares y bioestimulantes de uso agrícola.
- Evitar mezclas con productos muy ácidos y alcalinos.
- De cualquier forma, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.